

PRESCRIPTION AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT

A₂

	<i>Grossesse</i>	<i>Allaitement</i>
Pénicillines		
Aminopénicilline	Possible	Possible
Pénicilline G retard		
Pénicilline du groupe M		
Pénicilline V		
Amoxicilline-acide clavulanique	Possible	Possible
Céphalosporines		
C1G orales		
Céfaclor, céfalexine	Possible	Possible
Céfadroxil	Par prudence ne pas utiliser	Possible
Céfatrizine		
Céfazoline		
Céfradine		
C2G orales		
Céfuroxime	Possible	Possible
C3G orales		
Céfixime	Possible	Possible
Céfotiam		
Cefpodoxime		
C3G injectables		
Ceftriaxone	Possible	Possible
Macrolides et apparentés		
Azithromycine	1 ^{er} trimestre : par prudence, ne pas utiliser 2 ^e ou 3 ^e trimestre : possible	Déconseillé
Clarithromycine	Par prudence, ne pas utiliser	Par prudence, ne pas utiliser
Dirithromycine	Par prudence, ne pas utiliser	Par prudence, ne pas utiliser
Erythromycine	Possible	Possible
Josamycine	Possible	Possible
Midécamycine	Possible	Possible
Roxithromycine	Par prudence, ne pas utiliser	Possible
Spiramycine	Possible	Possible
Association spiramycine-métronidazole	Possible	Par prudence, ne pas utiliser
Synergistes		
Pristinamycine	Possible	Possible
Lincosamides		
Clindamycine	Par prudence, ne pas utiliser	Par prudence, ne pas utiliser

Kétolides

Télichromycine	Déconseillé	Déconseillé
Fluoroquinolones	Par prudence, ne pas utiliser	Contre-indiqué
Cyclines	1 ^e trimestre : possible 2 ^e ou 3 ^e trimestre : déconseillé	Contre-indiqué
Aminosides	Déconseillé	Contre-indiqué
Cotrimoxazole	Par prudence, ne pas utiliser	Déconseillé Contre-indiqué en cas de déficit en G6PD et chez le prématuré
Acide fusidique	Possible	Par prudence, ne pas utiliser
Rifampicine	Possible	Par prudence, ne pas utiliser

Nitro-5-imidazolés

Métronidazole	Possible	Possible en cas de traitement bref (2 jours)
Ornidazole	Déconseillé	
Secnidazole	Possible	
Tinidazole	1 ^{er} trimestre : déconseillé 2 ^e ou 3 ^e trimestre : possible	

Antipaludiques

Amodiaquine	Par prudence, ne pas utiliser	Par prudence, ne pas utiliser
Chloroquine	Possible	Possible
Halofantrine	Possible	Déconseillé
Méfloquine	Possible	Déconseillé
Proguanil	Possible	Suspendre l'allaitement
Quinine	Possible	Possible
Sulfadoxine + pyriméthamine	Par prudence, ne pas utiliser au 1 ^{er} trimestre Possible aux 2 ^e et 3 ^e trimestres	Suspendre l'allaitement
Proguanil + chloroquine	Possible	Suspendre l'allaitement
Atovaquone + proguanil	Possible	Déconseillé

Antifongiques

Fluconazole	Réservés aux situations mettant en jeu le pronostic vital	Déconseillé
Itraconazole		
Griséofulvine	Déconseillé	Si possible, repousser le traitement
Terbinafine	Par prudence, ne pas utiliser	Déconseillé

Traitement de l'herpès et du zona

Aciclovir	Possible	Par prudence ne pas utiliser
Valaciclovir	Possible	Par prudence ne pas utiliser
Famciclovir	Par prudence ne pas utiliser	Par prudence ne pas utiliser

