

■ ANGINES AIGUES BACTÉRIENNES*



- Seule l'angine érythémateuse ou érythémato-pultacée à streptocoque A (Test de Diagnostic Rapide positif) est justiciable de prescription d'antibiotique.
- Fièvre et douleur pharyngée : traitement symptomatique

LE TDR : UN OUTIL SIMPLE, RAPIDE À UTILISER ET PERFORMANT

- Aucun signe ou score clinique n'a de valeur prédictive positive et/ou négative suffisante pour affirmer l'origine streptococcique de l'angine (en dehors d'une scarlatine typique)
- Spécificité (voisine de celle des cultures) : 95% ; 5% de faux positifs (les porteurs sains)
- Sensibilité supérieure à 90% (10 % de faux négatifs)
- Résultats en 5 minutes maximum (augmentation de la durée de la consultation de moins de 3 mn)

LE TDR : CHEZ QUI ?


- Inutile
 - Avant 3 ans (angines virales et pas de RAA à cet âge)
 - Si scarlatine typique

LE TDR : comment ?

Procédures d'extraction


Placer un tube sur le portoir.

- 1- Ajouter 4 gouttes de réactif d'extraction A puis 4 gouttes de réactif B dans le tube.
- 2- Procéder à un écouvillonnage de gorge puis :
- 3- le déposer immédiatement dans le tube. Agiter vigoureusement l'écouvillon dans la solution en le pressant contre la paroi pour que le liquide soit rejeté et absorbé par le réactif. Attendre entre 1 et 15 mn.



Procédure de test

- 4- Déposer la bandelette durant 1 mn dans le tube puis la déposer sur une surface sèche.
- Selon la quantité de micro-organismes contenu dans l'écouvillon, le résultat positif peut être visible dès la première mn. Cependant, un temps réactionnel de 5 mn est nécessaire pour confirmer un résultat négatif. (Ne plus lire après 10 mn).



ANTIBIOTHÉRAPIE PROPOSÉE EN PREMIÈRE INTENTION* :

	<i>Adulte</i>	<i>Enfant</i>	<i>Durée</i>
Amoxicilline	1g x 2/j	50 mg/kg x 2/j 1 dose-poids x 2/j	6 jours

ANTIBIOTIQUES DE DEUXIEME INTENTION

■ En cas d'allergie aux pénicillines sans contre-indication aux céphalosporines

Cefpodoxime	100 mg x 2/j	4 mg/kg x 2/j 1 dose-poids x 2/j	5 jours
Céfuroxime	250 mg x 2/j	10 mg/kg x 2/j 1 dose poids x 2/j	4 jours
Cefotiam	200 mg x 2/j		5 jours

■ Si contre-indication aux bêta-lactamines

Pristinamycine	1 g x 2/j	50 mg/kg/j à partir de 6 ans	au moins 8 jours
Azithromycine***	500 mg en 1 prise	20 mg/kg**/j en 1 prise 1 dose poids x 1/j	3 jours
Clarithromycine***	500 mg x 2/j	7,5 mg/kg x 2/j 1 dose poids x 2/j	5 jours
Josamycine***	1g x 2/j	25 mg/kg x 2/j	5 jours

* Recommandations AFSSAPS Octobre 2005 ** A partir de 3 ans et jusqu'à 25 kg. A partir de 25 kg, dose fixe : 500 mg/j.

*** Après la mise en culture d'un prélèvement bactériologique

POUR SE PROCURER DES TESTS, S'ADRESSER À LA CPAM DE VOTRE SECTEUR :

■ MEURTHE ET MOSELLE

- NANCY : 03.83.90.82.76
- LONGWY : 03.82.44.21.64

■ MEUSE

- BAR LE DUC : 0 820 90 41 65

■ MOSELLE

- METZ : 03.87.39.38.57 ou 03.87.78.64.83
- THIONVILLE : 03.82.52.34.28
- SARREGUEMINES : 03.87.28.48.18

■ VOSGES

- Composez le : 0 820 904 166