

CALENDRIER DES VACCINATIONS



Recommandations du BEH N°16-17 du 22 avril 2008.

<p>À la naissance</p>	<p>Hépatite B Pour enfants nés de mère antigène HBs positif, elle doit être impérativement faite à la naissance avec un autre vaccin que HBVaxPRO, et en même temps que les immunoglobulines anti-HBs administrées dans un autre site.</p>	
<p>Dès 1 mois</p>	<p>Tuberculose : BCG précoce pour les enfants vivant dans un milieu à risque (précarité, migrants, séjour prolongé en zone d'endémie, ATCD familial de BK). Le contrôle post-vaccinal et la revaccination ne sont plus recommandés.</p>	<p>Vaccin BCG SSI®</p>
<p>À partir de 2 mois</p>	<p>Diphtérie, tétanos, poliomyélite (obligatoires), coqueluche, infections invasives à <i>Haemophilus influenzae b</i>, hépatite B</p> <p>Hépatite B Pour enfants nés de mère antigène HBs positif, 2^e et 3^e dose respectivement à 1 et 6 mois. Contrôle sérologique entre 7 et 12 mois.</p> <p>Vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent (cf fiche situations particulières)</p>	<p>Vaccin Infanrixhexa® M2 et M4 Pentavac® Vaccin Infanrixquinta® (M3)</p> <p>HBVaxPRO 5® Engérix B 10® 2 injections IM à un mois d'intervalle rappel 6 mois après</p> <p>Prévenar® 2 injections IM à un mois d'intervalle</p>
<p>12 mois</p>	<p>Rougeole-oreillons-rubéole Pour les nourrissons entrant en collectivité avant 12 mois, il est recommandé d'administrer le vaccin ROR dès l'âge de 9 mois. Dans ce cas, la 2^e dose est recommandée entre 12 et 15 mois et suffit. Vaccination immédiate efficace si moins de 72 heures après le contact avec un cas.</p> <p>Hépatite B Cette 3^e injection doit être réalisée entre 5 et 12 mois après la 2^e injection.</p> <p>Vaccin antipneumococcique conjugué heptavalent (en face de prévenar)</p>	<p>Vaccin Priorix® (SC) M-M-RvaxPro® (SC ou IM)</p> <p>HBVaxPRO 5® Engérix B 10® GenHevac B® Prévenar</p>

16-18 mois	<p>Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, infections invasives à <i>Haemophilus influenzae</i> 1^{er} rappel</p> <p>Rougeole-oreillons-rubéole La vaccination complète comprend 2 doses, 1^e dose à 12 mois, 2^e dose au moins 1 mois après la 1^e, si possible avant l'âge de 24 mois.</p>	<p>Pentavac[®] Vaccin Infanrixquinta[®]</p> <p>Vaccin Priorix[®] (SC) M-M-RvaxPro[®] (SC ou IM)</p>
6 ans	<p>Diphtérie, tétanos, poliomyélite 2^e rappel</p> <p>Rougeole-oreillons-rubéole 2 doses de vaccin triple à au moins 1 mois d'intervalle sont recommandées pour tous les enfants n'en ayant pas bénéficié, quels que soient leurs antécédents vis-à-vis des 3 maladies.</p>	<p>DTP[®] (SC profond ou IM)</p> <p>Vaccin Priorix[®] (SC) M-M-RvaxPro[®] (SC ou IM)</p>
11-13 ans	<p>Diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite 3^e rappel.</p> <p>Rougeole-oreillons-rubéole 2 doses de vaccin triple à au moins 1 mois d'intervalle sont recommandées pour tous les enfants n'en ayant pas bénéficié, quels que soient leurs antécédents vis-à-vis des 3 maladies.</p> <p>Hépatite B Si la vaccination n'a pas été pratiquée dans l'enfance, un schéma complet en trois injections : les deux premières à au moins un mois d'intervalle, la troisième 5 à 12 mois après la date de la deuxième injection.</p>	<p>Tétravac[®] acellulaire Vaccin Infanrixtétra[®] Repevax[®]</p> <p>Vaccin Priorix[®] (SC) M-M-RvaxPro[®] (SC ou IM)</p> <p>HBVaxPRO 5[®] Engérix B 10[®] GenHevac B[®]</p>
16-18 ans	<p>Diphtérie, tétanos, poliomyélite 4^e rappel</p> <p>Rappels ultérieurs diphtérie, tétanos et polio tous les dix ans.</p> <p>Rougeole-oreillons-rubéole 1 dose de vaccin trivalent pour les personnes de 13 à 25 ans n'ayant pas été vaccinées contre la rougeole auparavant</p>	<p>Revaxis[®] (SC profond ou IM)</p> <p>M-M-RvaxPro[®] (SC ou IM) Vaccin Priorix[®] (SC)</p>

18 ans -25 ans	<p>Diphtérie, tétanos, poliomyélite, tous les dix ans.</p> <p>A partir de 18 ans, on effectue le vaccin diphtérique contenant une dose réduite d'anatoxine diphtérique.</p> <p>Pour certains professionnels de santé et les adultes susceptibles de devenir parents dans les mois ou les années à venir, et n'ayant pas reçu de vaccination coquelucheuse au cours des 10 dernières années, un rappel de vaccination coquelucheuse acellulaire est recommandé.</p> <p>Rougeole-oreillons-rubéole 1 dose de vaccin trivalent pour les personnes de 13 à 25 ans n'ayant pas été vaccinées contre la rougeole auparavant.</p>	<p>Revaxis[®] (SC profond ou IM)</p> <p>Repevax[®] ou Boostrixtetra[®]</p> <p>ROR Vax[®] (SC ou IM) Vaccin Priorix[®] (SC)</p>
> 25 ans	<p>Diphtérie tétanos, poliomyélite, tous les dix ans.</p> <p>A partir de 18 ans, on effectue le vaccin diphtérique contenant une dose réduite d'anatoxine diphtérique.</p> <p>Pour certains professionnels de santé et les adultes susceptibles de devenir parents dans les mois ou les années à venir, et n'ayant pas reçu de vaccination coquelucheuse au cours des 10 dernières années, un rappel de vaccination coquelucheuse acellulaire est recommandé.</p> <p>Rubéole La vaccination contre la rubéole est recommandée pour les jeunes femmes non vaccinées, par exemple lors d'une consultation de contraception ou pré-nuptiale. Une contraception orale est impérative pendant 2 ou 3 mois après la vaccination. Si la sérologie prénatale est négative ou inconnue, la vaccination devra être pratiquée immédiatement après l'accouchement, de préférence avant la sortie de la maternité ou à défaut au plus tôt après la sortie.</p>	<p>Revaxis[®] (SC profond ou IM)</p> <p>Repevax[®] ou Boostrixtetra[®]</p> <p>Rudivax[®] (SC ou IM)</p>
À partir de 65 ans	<p>Grippe tous les ans.</p> <p>Penser aux rappels diphtérie, tétanos et polio tous les 10 ans.</p>	

Lorsqu'un retard est intervenu dans la réalisation du calendrier indiqué, il n'est pas nécessaire de recommencer tout le programme des vaccinations imposant des injections répétées. Il suffit de reprendre ce programme au stade où il a été interrompu et de compléter la vaccination en réalisant le nombre d'injections requis en fonction de l'âge.