

VACCINATIONS : RAPPELS ET SITUATIONS PARTICULIÈRES

F₂

RAPPEL

- Respect du mode d'administration (IM de plus en plus fréquent).
- Tous les vaccins inactivés peuvent être administrés en même temps.
- Un vaccin vivant peut être administré en même temps que des vaccins inactivés.
- Plusieurs vaccins vivants peuvent être administrés le même jour – sinon respecter un intervalle d'un mois minimum.
Il est recommandé de ne pas administrer le vaccin Repevax ou Boostrix chez un adulte ayant reçu récemment (<2 ans) un dT polio
- Vaccins vivants : BCG, rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, fièvre jaune.

Ces recommandations ne concernent pas les voyageurs en zone tropicale.

Les recommandations vaccinales dans cette situation ont été mises à jour dans le BEH n°24 du 12 juin 2007.

INDICATIONS PARTICULIÈRES

Pneumocoque - Terrain fragile (insuffisant respiratoire, cardiaque, sujet alcoolique avec hépatopathie)
Pneumo 23® - sujets ayant des antécédents d'infection pulmonaire ou invasive à pneumocoques.
- Immunodéprimé (splénectomie, drépanocytose homozygote, syndrome néphrotique).
- Rappel tous les 3 à 5 ans

Prevenar® La vaccination par le vaccin anti-pneumococcique conjugué heptavalent (PREVENAR®) est recommandée, à partir de 2 mois selon le schéma suivant :

2 injections à un mois d'intervalle et rappel un an plus tard.

Chez l'enfant de 2 à 5 ans : vaccination uniquement des groupes à risque par 2 injections de Prevenar à 2 mois d'intervalle et un Pneumo 23 deux mois après.

Chez l'enfant de plus de 5 ans à risque : une dose de Pneumo 23 tous les 5 ans.

Le Prevenar peut être injecté en même temps que le vaccin pentavalent

Définition des groupes à risque :

- asplénie fonctionnelle ou splénectomie ;
- drépanocytose homozygote ;
- infection par le VIH ;
- déficits immunitaires congénitaux ou secondaires à :
 - > une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique,
 - > un traitement immunosuppresseur ou une radiothérapie pour néoplasie, lymphome ou maladie de Hodgkin, leucémie, transplantation d'organe ;
- cardiopathie congénitale cyanogène, insuffisance cardiaque ; pneumopathie chronique (à l'exception de l'asthme, sauf les asthmes sous corticothérapie prolongée) ; brèche cérébro-méningée ; diabète.

<p>Varicelle Varivax® SC Varilrix® SC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pas d'indication actuelle chez l'enfant sauf cas particuliers, - Professionnels sans antécédent de varicelle (ou dont l'histoire est douteuse) et dont la sérologie est négative qui exercent les professions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> > professionnels en contact avec la petite enfance (crèches et collectivités d'enfants notamment), > professionnels de santé en formation, à l'embauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de varicelle grave (immuno-déprimés, services de gynéco-obstétrique, néonatalogie, maladies infectieuses). 	<p>Grippe</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penser aux professionnels de santé, aux personnels navigants ou accompagnants (bateaux, avions, voyages)
<p>Coqueluche de l'adulte Repevac® (dTCoq acellulaire Polio) Boostrixetra®</p>	<p>Risque de contamination des nouveaux-nés par l'adulte jeune malade</p> <ul style="list-style-type: none"> > personnels des maternités, des services de néonatalogie, de tout service de pédiatrie prenant en charge des nourrissons âgés de moins de 6 mois > adultes susceptibles d'être parents, non revaccinés depuis plus de 10 ans <p>Pour les étudiants des filières médicales ou paramédicales, il est recommandé de pratiquer cette vaccination à l'occasion d'un rappel dTP en utilisant un vaccin à 4 valences.</p>	<p>Méningocoque Meningitec®, Méninvact® Vaccin méningococcique A + C®</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Enfants à partir de 2 mois exposés à un contact ou en situation épidémique - Adultes exposés à un contact, en situation épidémique ou en voyage en zone d'endémie - Enfants souffrant de déficit en fraction terminale du complément, en propperdine ou ayant une asplénie anatomique ou fonctionnelle.
<p>Encéphalite à tique Ticovac®</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Patients à haut risque de morsure de tiques (forêts d'Europe de l'Est) - Au vu des données présentées par l'InVs et par le CNR, il n'y a pas d'indication de recommandation officielle de ce vaccin pour certaines zones françaises. La prescription de ce vaccin devra être posée au cas par cas. <p>Il existe une forme enfant à 1/2 dose.</p>	<p>HPV Gardasil® Cervarix®</p>	<p>HPV 16 et 18 (AMM en attente) HPV 6,11,16 et 18 (AMM 09/2006) 3 doses : M0, M1 et M6 Indications : jeunes filles de plus de 14 ans rattrapage 15-23 ans avant ou dans l'année des premiers rapports sexuels</p>
<p>Hépatite A Havrix® Avaxim® Vaqta®</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sujets exposés professionnellement à un risque de contamination : personnels de crèche, d'internats des établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapée, personnels de traitement des eaux usées, personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective - Porteur d'une hépatopathie chronique avec sérologie négative. <p>La vaccination anti-hépatite A (1440U) ne doit pas comporter plus de 2 injections espacées d'au moins 6 mois</p>	<p>Fièvre jaune Stamaril®</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A partir de l'âge de 6 mois pour tout voyageur ou résidant en zone d'endémie (Afrique intertropicale, Guyane, Amérique du Sud) - Rappel tous les 10 ans - Disponible uniquement dans les centres anti amariles sur rendez-vous CHU Nancy : 03.83.15.41.28 - Hôpital Legouest Metz : 03.87.56.48.62

CAS DE LA FEMME ENCEINTE

- Pas d'urgence le plus souvent.
- Vaccins contre-indiqués : vaccins vivants (rougeole, oreillons, rubéole, varicelle).
En cas de vaccination : pas d'indication d'interruption de grossesse.
- Sans danger : tétanos, polio, rage.